

Sildalis (Силдалис)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- **Международное название:** Tadalafil Tablets Sildenafil Citrate
- **Фармакологическая группа:** ингибитор ФДЭ5 (фосфодиэстеразы-5)
- **Активное вещество:** Тадалафил+ Sildenafil
- **Лекарственная форма:** таблетки по 6шт в блистере, прямоугольной формы, покрытые оболочкой.

Фармакологическое действие

Силдалис 120 мг — это препарат для лечения эректильной дисфункции. Входящие в него компоненты, Тадалафил и Силденафил, способствуют одновременному повышению тонуса сосудов и расслаблению мышц. Благодаря составу препарата происходит стимулирование кровообращения в половых органах. Как итог, возникает стабильная и естественная эрекция.



Способ применения "Силдалис (Sildalis)"

Рекомендованная доза для первого приёма составляет 60 мг в сутки. При недостаточной эффективности дозировку увеличивают до 120 мг в сутки.

Побочные действия "Силдалис (Sildalis)"

К возможным побочным явлениям относятся: мышечные боли в спине, тахикардия, нарушение цветового восприятия, аллергический ринит, головные боли и диспепсические расстройства. Побочные действия носят кратковременный характер. Если негативные эффекты держатся несколько часов, то необходимо обратиться за помощью к врачу.

Противопоказания "Силдалис (Sildalis)"

Препарат противопоказан при индивидуальной непереносимости к компонентам. Силдалис плохо сочетается с такими лекарствами, как ритановир, интраконазол, кетоконазол и эритромицин. Нельзя принимать препарат вместе со средствами, понижающими давление и содержащими нитраты. Перед приёмом Силдалиса необходимо проконсультироваться с врачом тем, кто имеет нарушения зрения в тяжёлых формах, патологию сердечно-сосудистой системы, хронические заболевания почек и печени.

[Заказать](#)

